

# MATEMÁTICA

1

O número de gols marcados nos 6 jogos da primeira rodada de um campeonato de futebol foi 5, 3, 1, 4, 0 e 2.

Na segunda rodada, serão realizados mais 5 jogos. Qual deve ser o número total de gols marcados nessa rodada para que a média de gols, nas duas rodadas, seja 20% superior à média obtida na primeira rodada?

## Resolução

Seja  $M_1$  a média de gols da primeira rodada,  $M_G$  a média de gols das duas primeiras rodadas e  $x$  o número de gols da segunda rodada, tem-se

$$M_G = (1 + 20\%) M_1 \Rightarrow \frac{15 + x}{6 + 5} = 1,20 \cdot \frac{15}{6} \Leftrightarrow$$


$$\Leftrightarrow 15 + x = 33 \Leftrightarrow x = 18$$

**Resposta:** 18 gols

2

Três cidades A, B e C situam-se ao longo de uma estrada reta; B situa-se entre A e C e a distância de B a C é igual a dois terços da distância de A a B. Um encontro foi marcado por 3 moradores, um de cada cidade, em um ponto P da estrada, localizado entre as cidades B e C e à distância de 210 km de A. Sabendo-se que P está 20 km mais próximo de C do que de B, determinar a distância que o morador de B deverá percorrer até o ponto de encontro.

## Resolução



Nas condições representadas na figura, tem-se:

$$\begin{cases} \frac{2}{3}y = x + (x - 20) \\ x + y = 210 \end{cases} \Rightarrow 2y = 6x - 60 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 60 \\ y = 150 \end{cases}$$


**Resposta:** 60 km

**3**

Um triângulo ABC tem lados de comprimentos  $AB = 5$ ,  $BC = 4$  e  $AC = 2$ . Sejam M e N os pontos de  $\overline{AB}$  tais que  $\overline{CM}$  é a bissetriz relativa ao ângulo  $\widehat{ACB}$  e  $\overline{CN}$  é a altura relativa ao lado  $\overline{AB}$ .

Determinar o comprimento de  $\overline{MN}$ .

**Resolução**



Sendo  $x$  o comprimento do segmento  $\overline{MN}$ , tem-se:

$$1) \overline{CM} \text{ é bissetriz} \Rightarrow \frac{AC}{AM} = \frac{BC}{BM} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{AM} = \frac{4}{5 - AM} \Leftrightarrow AM = \frac{5}{3} \Rightarrow AN = \frac{5}{3} - x$$

$$\text{e } BN = 5 - \left( \frac{5}{3} - x \right) = \frac{10}{3} + x$$

$$2) \text{ No triângulo retângulo } ANC, CN^2 + AN^2 = 4$$

$$3) \text{ No triângulo retângulo } BNC, CN^2 + BN^2 = 16$$

4) Dos itens (2) e (3), conclui-se que

$$BN^2 - AN^2 = 12 \Rightarrow \left( \frac{10}{3} + x \right)^2 - \left( \frac{5}{3} - x \right)^2 = 12$$

$\Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{100}{9} + \frac{20}{3}x + x^2 - \frac{25}{9} + \frac{10}{3}x - x^2 = 12 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 10x + \frac{25}{3} = 12 \Rightarrow x = \frac{11}{30}$$

**Resposta:**  $\frac{11}{30}$

Considere a equação  $z^2 = \alpha z + (\alpha - 1)\bar{z}$ , onde  $\alpha$  é um número real e  $\bar{z}$  indica o conjugado do número complexo  $z$ .

- a) Determinar os valores de  $\alpha$  para os quais a equação tem quatro raízes distintas.  
 b) Representar, no plano complexo, as raízes dessa equação quando  $\alpha = 0$ .

### Resolução

a) Sendo  $z = x + yi$ , com  $x$  e  $y$  reais, tem-se

$$\begin{aligned} z^2 = \alpha z + (\alpha - 1)\bar{z} &\Rightarrow (x + yi)^2 = \alpha(x + yi) + (\alpha - 1)(x - yi) \\ &\Rightarrow x^2 + 2xyi - y^2 = \alpha x + \alpha yi + \alpha x - \alpha yi - x + yi \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - y^2 + 2xyi = (2\alpha - 1)x + yi \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = (2\alpha - 1)x \\ 2xy = y \Leftrightarrow y = 0 \text{ ou } x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Para  $y = 0$  tem-se  $x^2 = (2\alpha - 1)x \Leftrightarrow$   
 $\Leftrightarrow x^2 - (2\alpha - 1)x = 0$ , que só admite duas raízes distintas se  $(2\alpha - 1) \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq \frac{1}{2}$

Para  $x = \frac{1}{2}$ , tem-se  $\left(\frac{1}{2}\right)^2 - y^2 = (2\alpha - 1) \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow$   
 $\frac{1}{4} - y^2 = \alpha - \frac{1}{2} \Rightarrow y^2 = \frac{3}{4} - \alpha$ , que só admite duas raízes distintas se  $\frac{3}{4} - \alpha > 0 \Rightarrow \alpha < \frac{3}{4}$ .

Assim sendo, se  $\alpha < \frac{3}{4}$  e  $\alpha \neq \frac{1}{2}$ , as 4 raízes serão


$$\begin{aligned} z_1 = 0, z_2 = 2\alpha - 1, z_3 = \frac{1}{2} + i\sqrt{\frac{3}{4} - \alpha} \text{ e} \\ z_4 = \frac{1}{2} - i\sqrt{\frac{3}{4} - \alpha} \end{aligned}$$

b) Para  $\alpha = 0$ , as raízes são  $z_1 = 0 = (0; 0)$ ,

$$z_2 = -1 = (-1; 0), z_3 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\text{e } z_4 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \left(\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

cuja representação no gráfico cartesiano é:



**Respostas:** a)  $\alpha \in \mathbb{R} / \alpha < \frac{3}{4}$  e  $\alpha \neq \frac{1}{2}$   
 b) gráfico

**5**

O produto de duas das raízes do polinômio  $p(x) = 2x^3 - mx^2 + 4x + 3$  é igual a  $-1$ . Determinar

- a) o valor de  $m$ .  
 b) as raízes de  $p$ .

**Resolução**

Seja  $V = \{a, b, c\}$  o conjunto-verdade da equação  $p(x) = 2x^3 - mx^2 + 4x + 3 = 0$  e  $ab = -1$ , temos:

$$a) \left. \begin{aligned} a \cdot b \cdot c &= -\frac{3}{2} \\ ab &= -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow c = \frac{3}{2}$$

$$ab + ac + bc = 2 \Leftrightarrow ab + c(a + b) = 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -1 + \frac{3}{2}(a + b) = 2 \Leftrightarrow a + b = 2$$

$$a + b + c = \frac{m}{2} \Leftrightarrow 2 + \frac{3}{2} = \frac{m}{2} \Leftrightarrow m = 7$$


$$b) \left\{ \begin{aligned} a + b &= 2 \\ a \cdot b &= -1 \end{aligned} \right. \Rightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$$

$$\text{então: } V = \{(1 - \sqrt{2}), (1 + \sqrt{2}), 3/2\}$$


**Respostas:** a)  $m = 7$  b)  $V = \{(1 - \sqrt{2}), (1 + \sqrt{2}), 3/2\}$

6

A figura abaixo representa duas polias circulares  $C_1$  e  $C_2$  de raios  $R_1 = 4$  cm e  $R_2 = 1$  cm, apoiadas em uma superfície plana em  $P_1$  e  $P_2$ , respectivamente. Uma correia envolve as polias, sem folga. Sabendo-se que a distância entre os pontos  $P_1$  e  $P_2$  é  $3\sqrt{3}$  cm, determinar o comprimento da correia.



### Resolução



O comprimento  $L$ , em centímetros, dessa polia é dado por:

$$L = \left( \frac{360^\circ - \theta}{360^\circ} \right) \cdot 2 \cdot \pi \cdot 4 + \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1 + 2 \cdot 3\sqrt{3}$$

em que:

$$\operatorname{tg} \left( \frac{\theta}{2} \right) = \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \text{ e } 0^\circ < \theta < 180^\circ$$

$$\text{Assim: } \frac{\theta}{2} = 60^\circ \Leftrightarrow \theta = 120^\circ \text{ e}$$

$$L = \left( \frac{360^\circ - 120^\circ}{360^\circ} \right) \cdot 2 \cdot \pi \cdot 4 + \frac{120^\circ}{360^\circ} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1 + 2 \cdot 3\sqrt{3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow L = \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 4 + \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1 + 2 \cdot 3\sqrt{3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow L = 6\pi + 6\sqrt{3} \Leftrightarrow L = 6(\pi + \sqrt{3})$$


**Resposta:**  $6(\pi + \sqrt{3})$  cm

**7**


Na figura a seguir, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo retângulo, sendo  $\hat{B}$  o ângulo reto.

Sabendo-se que  $A(0,0)$ , B pertence à reta  $x - 2y = 0$  e  $P = (3,4)$  é o centro da circunferência inscrita no triângulo ABC, determinar as coordenadas

- do vértice B.
- do vértice C.



### Resolução



- a) 1º) O raio da circunferência de centro  $P(3; 4)$ , e tangente à reta de equação  $x - 2y = 0$ , é a distância:

$$r = \frac{|3 - 2 \cdot 4|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

- 2º) O ponto B pertence à reta  $x - 2y = 0$ , então  $B(2b; b)$ .

- 3º) O triângulo APQ é retângulo no ponto Q, com  $AP = 5$  e  $PQ = \sqrt{5}$ , então:

$$AQ^2 = 5^2 - (\sqrt{5})^2 = 20 \Leftrightarrow AQ = 2\sqrt{5}$$

$$4^\circ) AB = AQ + r = 3\sqrt{5} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2b)^2 + b^2 = (3\sqrt{5})^2 \Leftrightarrow 5b^2 = 45 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow b^2 = 9 \Rightarrow b = 3, \text{ pois } b > 0$$

Portanto,  $B(6; 3)$ .

b) 1º) A reta  $\overleftrightarrow{AC}$ , de equação  $y = m \cdot x \Leftrightarrow mx - y = 0$ , é tal que:

$$\frac{|m \cdot 3 - 4|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \sqrt{5} \Leftrightarrow 4m^2 - 24m + 11 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow m = \frac{11}{2} \text{ ou } m = \frac{1}{2}$$

Como a reta  $\overleftrightarrow{AC}$  tem coeficiente angular  $m = \frac{11}{2}$ , pois  $\frac{1}{2}$  é o coeficiente angular da

reta  $\overleftrightarrow{AB}$ , sua equação é  $y = \frac{11}{2}x$

2º) A reta  $\overleftrightarrow{BC}$ , que passa pelo ponto  $B(6; 3)$  e tem coeficiente angular  $m = -2$  (a reta  $\overleftrightarrow{BC}$  é perpendicular à reta  $\overleftrightarrow{AB}$ ) tem equação:

$$y - 3 = -2 \cdot (x - 6) \Leftrightarrow y = -2x + 15$$

3º) O ponto  $C$  é a intersecção das retas  $\overleftrightarrow{AC}$  e  $\overleftrightarrow{BC}$ , então:

$$\begin{cases} y = \frac{11}{2} \cdot x \\ y = -2x + 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 11 \end{cases}$$

Portanto:  $C(2; 11)$ .


**Respostas:** a)  $B(6; 3)$     b)  $C(2; 11)$

**8**


Na figura ao lado, cada uma das quatro circunferências externas tem mesmo raio  $r$  e cada uma delas é tangente a outras duas e à circunferência interna  $C$ .

Se o raio de  $C$  é igual a 2, determinar

- o valor de  $r$ .
- a área da região hachurada.



### Resolução



- a)  $2(r + 2)$  é a medida da diagonal de um quadrado de lado  $2r$

Assim:

$$2(r + 2) = 2r\sqrt{2} \Leftrightarrow r + 2 = r\sqrt{2} \Leftrightarrow r(\sqrt{2} - 1) = 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{2}{\sqrt{2} - 1} \Leftrightarrow r = 2(\sqrt{2} + 1)$$

- b) A área  $S$  da região hachurada é igual à área de um quadrado de lado  $2r$  menos a soma das áreas de um círculo de raio  $r$  e um círculo de raio 2, ou seja:

$$S = (2r)^2 - \pi r^2 - \pi 2^2 \Leftrightarrow S = (4 - \pi) \cdot r^2 - 4\pi$$

Assim:



$$\begin{aligned} S &= (4 - \pi) \cdot (2\sqrt{2} + 2)^2 - 4\pi \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow S &= (4 - \pi) \cdot (12 + 8\sqrt{2}) - 4\pi \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow S &= 4[(4 - \pi)(3 + 2\sqrt{2}) - \pi] \end{aligned}$$

**Respostas:** a)  $2(\sqrt{2} + 1)$

b)  $4[(4 - \pi)(3 + 2\sqrt{2}) - \pi]$

Seja  $m \geq 0$  um número real e sejam  $f$  e  $g$  funções reais definidas por  $f(x) = x^2 - 2|x| + 1$  e  $g(x) = mx + 2m$ .

a) Esboçar, no plano cartesiano representado ao lado,

os gráficos de  $f$  e de  $g$  quando  $m = \frac{1}{4}$  e  $m = 1$ .

b) Determinar as raízes de  $f(x) = g(x)$  quando  $m = \frac{1}{2}$ .

c) Determinar, em função de  $m$ , o número de raízes da equação  $f(x) = g(x)$ .

### Resolução


a) Sendo:

$$f(x) = x^2 - 2|x| + 1,$$

$$g(x) = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \text{ (quando } m = \frac{1}{4} \text{) e}$$

$$g(x) = x + 2 \text{ (quando } m = 1 \text{),}$$

temos os gráficos abaixo:



$$b) f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 - 2|x| + 1 = \frac{1}{2}x + 1, \text{ para } m = \frac{1}{2}$$

$$1^\circ) x \leq 0 \Rightarrow f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 + 2x + 1 = \frac{1}{2}x + 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + \frac{3}{2}x = 0 \Leftrightarrow x(x + \frac{3}{2}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = -\frac{3}{2}$$

$$2^\circ) x \geq 0 \Rightarrow f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = \frac{1}{2}x + 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - \frac{5}{2}x = 0 \Leftrightarrow x(x - \frac{5}{2}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{5}{2}$$

O conjunto-verdade da equação é


$$V \left\{ 0; -\frac{3}{2}; \frac{5}{2} \right\}, \text{ para } m = \frac{1}{2}$$

c) O gráfico de  $f$  não depende dos valores assumidos pelo número real  $m \geq 0$ .

A sentença  $g(x) = mx + 2m$  representa uma família de retas que passam pelo ponto  $(-2; 0)$ .


Analisando as posições dos dois gráficos, para  $m \geq 0$ , temos:

1)  $m = 0 \Rightarrow g(x) = 0$




A equação tem duas raízes reais distintas, que são -1 e 1.

2)  $0 < m < \frac{1}{2}$




A equação admite quatro raízes reais distintas, sendo duas negativas e duas positivas.

3)  $m = \frac{1}{2} \Rightarrow g(x) = \frac{1}{2} x + 1$



A equação admite três raízes reais distintas, que são  $-\frac{3}{2}$ ,  $0$  e  $\frac{5}{2}$ .

$$4) m > \frac{1}{2}$$



A equação admite duas raízes reais distintas, sendo uma negativa e outra positiva.

**Respostas:** a) gráfico

$$b) \left\{ -\frac{3}{2}; 0; \frac{5}{2} \right\}$$

c)  $m = 0 \Rightarrow 2$  raízes reais

$$0 < m < \frac{1}{2} \Rightarrow 4$$
 raízes reais

$$m = \frac{1}{2} \Rightarrow 3$$
 raízes reais

$$m > \frac{1}{2} \Rightarrow 2$$
 raízes reais



$$\Leftrightarrow V = \frac{\ell^3 \sqrt{2}}{6} + \frac{\ell^3 \sqrt{2}}{4} \Leftrightarrow V = \frac{5\sqrt{2} \ell^3}{12}$$

**Resposta:**  $\frac{5\sqrt{2} \ell^3}{12}$